

# پروژه مرغ بومی



سازمان جهاد سازندگی استان لرستان  
مدیریت ترویج و مشارکت مردمی

بسم الله الرحمن الرحيم

نشریه ترویجی

# پژوهش مرغ بومی



سازمان جهاد سازندگی استان لرستان

مدیریت ترویج و مشارکت مردمی



- عنوان: پرورش مرغ بومی □
- مؤسسه: قدرت ا... منصوری - محمد حسن میرزایی □
- بررسی کارشناسی و آماده سازی: اداره تدوین متون مرکز نشر و تصویر □
- ناشر: مدیریت ترویج و مشارکت مردمی جهاد استان لرستان □
- حروفچینی: علی نقی دلدار □
- صفحه‌آرایی: محمد صالحی پور □
- نوبت و زمان چاپ: نوبت اول، ۱۳۷۹ □



## فهرست مطالب

۴ .....	مقدمه .....
۵ .....	اهمیت نگهداری مرغ بومی در روستا .....
۵ .....	انتخاب تزادهای تخمگذار .....
۵ .....	انتخاب تخم مرغ مناسب .....
۶ .....	تشخیص نشانه‌های مرغ کرج .....
۶ .....	خوابانیدن مرغ کرج .....
۷ .....	نگهداری جوجه‌ها در ماه اول .....
۸ .....	دوره رشد جوجه‌ها .....
۸ .....	عامل‌های مهم تلفات جوجه‌ها و کم شدن تولید تخم مرغ .....
۹ .....	محل نگهداری مرغ بومی .....
۱۰ .....	اندازه لانه .....
۱۱ .....	محل خواب مرغ‌های بومی .....
۱۲ .....	بهداشت لانه .....
۱۳ .....	غذای مرغ بومی .....
۱۴ .....	رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماریها .....
۱۵ .....	بیماری‌های طیور .....
۱۵ .....	بیماری نیوکاسل .....
۱۶ .....	پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل .....
۱۸ .....	خلاصه مطالب .....
۱۹ .....	پرسش و خودآزمایی .....

## مقدمه

پرورش مرغ بومی از زمان‌های قدیم در خانواده‌های روستایی رواج داشته است. آنان در کنار کشاورزی و دامداری، کار پرورش مرغ بومی، بوقلمون و غاز را نیز انجام می‌داده‌اند. این کار در خودکفایی خانواده‌های روستایی و فراهم کردن پروتئین مصرفی آنان کمک زیادی بوده است.

پرورش مرغ بومی با استفاده از روش‌های جدید مرغداری، علاوه بر خودکفایی، درآمد خانواده را هم زیاد می‌کند. برای این کار باید نکته‌های مدیریتی و بهداشتی را رعایت کرد. نکته‌هایی مانند ساختن لانه بهداشتی، تهیه دان و آب سالم، واکسن زدن به موقع، پیشگیری از بیماری‌ها و درمان آنها در بهره‌برداری خوب و اقتصادی نقش مهمی دارند.

در این نشریه شما روستاییان عزیز با نکته‌های مهم بهداشتی و مدیریتی پرورش مرغ بومی آشنا می‌شوید.

## اهمیت نگهداری مرغ بومی در روستا


اضافه مواد غذایی و چیزهای کم ارزش کشاورزی از راه مناسب به مصرف مرغ‌ها می‌رسد. در نتیجه این ماده‌های اضافه به محصولات مفیدی مانند تخم مرغ و گوشت تبدیل می‌شوند. تخم مرغ و مقدار زیادی از گوشت لازم روستاییان و عشاير از راه نگهداری مرغ فراهم می‌شود. نگهداری مرغ برای خانواده روستایی و عشايری یک منبع درآمد است.

## انتخاب نژادهای تخمگذار

به طور معمول، نژاد تخمگذار، سبک وزن و کوچک اندام است. مرغ‌های این نژاد بیشتر در حالت حرکت و فعالیت هستند. این مرغ‌ها برای جستجوی خوراک به زمین نوک و پا می‌زنند. به همین دلیل، همیشه تندرست و شاداب هستند. جوجه‌های نژاد تخمگذار از پنج تا شش ماهگی به تخم می‌آیند. به علاوه، جوجه خروس‌های این نژاد هم زودتر به بازار مصرف می‌رستند.

## انتخاب قیم مرغ مناسب

برای شروع کار مرغداری، انتخاب تخم مرغ خیلی مهم است. برای این که تولید پرفایده‌ای داشته باشیم، باید در انتخاب تخم مرغ بیشتر دقت کنیم. یک تخم مرغ خوب را از ظاهر آن نمی‌توان شناخت، بلکه باید آن را در مقابل نور قرار دهیم. اگر کیسه هوایی که در یک سرتخم مرغ قرار دارد، با حرکت دادن تخم مرغ حرکت کند، این تخم مرغ برای جوجه‌شدن مناسب نیست. همچنین تخم مرغی که نطفه در آن پیدا نباشد، برای این کار خوب نیست.



شکل شماره ۱- اجزای اصلی تخم مرغ

تخم مرغ‌های جوچه‌کشی باید شکل و وضع طبیعی داشته باشند. شکل‌های نامناسب تخم مرغ مانند آهکی، کمرینددار، دراز و باریک با رنگ غیرطبیعی برای جوچه‌کشی مناسب نیستند. به طور معمول، تخم مرغ‌هایی که شکل هماهنگ و طبیعی داشته باشند، با وزن پنجاه تا پنجاه و پنج گرم برای جوچه‌کشی مناسب هستند.

### تشخیص نشانه‌های مرغ کرج


مرغ‌های کرج شبها در لانه‌هایی می‌خوابند که در آن تخم می‌گذارند. اما مرغ‌های معمولی در لانه‌ای که تخم می‌گذارند، نمی‌خوابند. به علاوه وقتی که به مرغ کرج نزدیک می‌شوید با صدای جیغ مانندی شمارا می‌ترسند. همچنین پرهای گردن و بدن خود را پوش می‌دهد. در نتیجه، عضله‌های سینه‌اش دیده می‌شود و پوست بدنش به رنگ سرخ درمی‌آید. به علاوه، حرارت بدن مرغ کرج بالا می‌رود و کم خوراک می‌شود.

### خوابانیدن مرغ کرج

محل خوابانیدن مرغ کرج باید آرام و دور از سر و صدا و رفت و آمد باشد. همچنین اگر کمی تاریک و مرطوب باشد و هوا به خوبی در آنجا جریان داشته باشد، بهتر است. برای خوابانیدن مرغ کرج می‌توان از یک جعبه یا سبد استفاده کرد. سپس کف آن را مقداری کاه یا کلش خشک ریخت. برای این که کاه بیرون نریزد، باید جعبه دست کم هشت سانتی‌متر لبه داشته باشد.

### تعداد تخم مرغ‌ها

تعداد تخم مرغ‌هایی که زیر مرغ می‌گذارند به بزرگی و کوچکی مرغ و تخم مرغ‌ها بستگی دارد. سرد بودن یا گرم بودن هوا نیز در این کار در نظر گرفته می‌شود. در زمستان تعداد تخم مرغ‌های کمتر و در تابستان تعداد بیشتری می‌توان در زیر مرغ قرار



شکل شماره ۲- رعایت تعداد تخم مرغ‌های زیر مرغ در جوجه‌آوری مهم است

داد. به طور کلی باید تعدادی تخم مرغ زیر مرغ قرار دهید که وقتی روز بعد نگاه می‌کنید، هیچ یک از آنها پیدا نباشدند.

گاهی، وقتی یکی از تخم مرغ‌ها از زیر مرغ کمی بیرون می‌آید، به آن توجه نمی‌شود. برخی فرض می‌کنند که اگر یکی هم در نیامد، اشکالی ندارد. ولی باید توجه داشت که مرغ کرج به طور مداوم جای تخم‌ها را عوض می‌کند و آنها را می‌چرخاند. در نتیجه، هر تخم مدت چند ساعتی بیرون می‌ماند و سرد و فاسد می‌شود. گاهی برای یک یا دو تخم اضافه، تمام جوجه‌ها آسیب می‌بینند و یا تخم مرغ‌ها به کلی از بین می‌روند.

### نگهداری جوجه‌ها در ماه اول

باید توجه داشته باشید که نگهداری جوجه‌ها در هفته اول بسیار مهم است. در حقیقت ماه اول، زمان حساسی در زندگی جوجه‌ها به حساب می‌آید. در روزهای اول


تولد باید دقیق کرد که جوجه‌ها هنگام بیرون آمدن از لانه زیر پای مرغ مادر آسیب نمی‌یند. همچنین زیر پای جوجه‌های بزرگتر یا حیوانات دیگر له نشوند. خوراک جوجه در روزهای اول باید به صورت پودر (آردی شکل) باشد. دادن دانه سالم به جوجه‌ها در هفته اول باعث مرگ آنان می‌شود. به علاوه باید دقیق کرد که در لانه و مسیر حرکت جوجه‌ها دانه سالم تریخته باشد.

### دوره رشد جوجه‌ها

مهتمترین مشکل مرغداری بومی در کشور ما، زیادبودن تعداد تلفات جوجه‌ها و کم‌بودن تولید تخم مرغ است. در فصل بهار هر مرغی ده تا پانزده جوجه به دنبال دارد. ولی در پاییز این تعداد به دو تا سه جوجه می‌رسد. یعنی حدود هفتاد درصد جوجه‌ها تلف می‌شوند.

### عامل‌های مهم تلفات جوجه‌ها و کم‌شدن تولید تخم مرغ

۱- بیماری‌ها و نزدنا و اکسن به موقع، باعث مرگ و میر جوجه‌ها می‌شود. با مراجعه به دامپزشکی و واکسن‌زنی جوجه‌ها و مرغ‌ها می‌توان از تلفات آنها جلوگیری کرد.



شکل شماره ۳- تهیه دانخوری و آبخوری متناسب با تعداد مرغها موجب کاهش آسیبهای فیزیکی آنها می‌شود


۲- آسیب‌های فیزیکی که با مدیریت و مراقبت‌های به موقع و درست می‌توان این مشکل را نیز برطرف کرد.

۳- کم شدن تولید تخم مرغ در مرغ‌های بومی، به دلیل کم توجهی به آنان برخی مرغ‌های بومی در طول یک سال بین چهل تا نود عدد تخم می‌گذارند. اگر انتخاب مرغ از نوع تخمگذار باشد و در زمان تخمگذاری غذای تکمیلی به مرغ‌ها داده شود، با مدیریت درست می‌توان تولید تخم مرغ را در یک سال به بیشتر از صد عدد رساند:

### محل نگهداری مرغ بومی

در بیشتر روستاهای برای نگهداری مرغ‌ها، محل مناسبی در نظر نمی‌گیرند. به طور معمول مرغ‌ها در گوشه‌ای از حیاط، سیاه چادر، گوشه آغل‌ها و غیره به سر می‌برند. برای بهتر شدن تولید در مرغ بومی، لازم است لانه‌ای با رعایت نکته‌های ایمنی و بهداشتی ساخته شود. در ساخت لانه نکته‌های زیر را باید در نظر گرفت:

۱- با توجه به نوع آب و هوا و امکانات روستا، لانه مرغ از آجر، سنگ، بلوک سیمانی و غیره ساخته شود.




شکل شماره ۴- استفاده از سنگ و سیمان در ساختمان لانه، بهداشتی و مقوون به صرفه است

- ۲- کف لانه باید از زمین بلندتر باشد. به علاوه کف آن سیمانی بوده و شیب ملایمی داشته باشد تا هم به راحتی شسته شود و هم آب در آن جمع نشود. شیب لانه باید به طرف پشت آن باشد.
- ۳- دیوار لانه نیز باید سیمانکاری بشود.
- ۴- لانه نباید در محل بادگیر ساخته شود.
- ۵- جهت لانه باید طوری باشد که در آن به طرف جنوب بوده و آفتاب به داخل آن بتابد.
- ۶- لانه مرغ باید طوری ساخته شود که در زمستان گرم و در تابستان خنک باشد.

### اندازه لانه

برای هر چهار مرغ بوصی یک مترمربع جا در لانه لازم است. به علاوه برای گردش مرغها در خارج از لانه، برای هر چهار مرغ دو متر مربع فضای آزاد لازم است. کاشت بعضی از علوفه‌ها مثل جو و شبدر در محل گردش مرغها برای استفاده آنان مفید است.



شکل شماره ۵- فضای لانه متناسب با تعداد مرغها در نظر گرفته شود


برای آبخوری مرغ‌ها بهتر است که از آبخوری سیفونی یا کله‌قندی استفاده کنید. هر پنجاه مرغ می‌توانند از یک آبخوری سینونی استفاده کنند. همچنین برای هر بیست مرغ یک آبخوری کله‌قندی کافی است.

### محل خواب مرغ‌های بومی

گاهی مرغ‌ها در لانه، در ظرف دانخوری می‌خوابند. همچنین در فصل تابستان، هنگام شب روی آغل‌ها یا جاهای دوردست می‌خوابند. در نتیجه، جانوران وحشی به آنان حمله می‌کنند. بنابراین لازم است در لانه‌هایی که سقف بلند دارند و در فضای باز، هنگام تابستان برای مرغ‌ها چوب خواب تهیه شود، پهناهی چوب خواب باید حدود چهار سانتی‌متر و ضخامت آن سه سانتی‌متر باشد. طول چوب خواب برای هر مرغ بیست تا بیست و پنج سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. بلندی آن از زمین برای جوجه‌ها چهل سانتی‌متر و برای مرغ‌ها نود سانتی‌متر مناسب است.

### محل تخمگذاری


لازم است در یک قسمت لانه، محلی برای تخمگذاری مرغ‌ها در نظر گرفته شود. محل تخمگذاری باید طوری باشد که جمع‌آوری تخمه راحت و کف آن پوشال داشته باشد. برای هر پنج تا شش مرغ تخمگذار یک محل برای تخمگذاری در نظر می‌گیرند. به علاوه، برای هر پنجاه مرغ یک متر مربع جا برای تخمگذاری لازم است.



شکل شماره ۶- وجود محل تخمگذاری به اندازه کافی باعث افزایش تعداد و حفظ کیفیت تخم مرغ‌ها می‌شود



شکل شماره ۷- جمع آوری فضولات از شیوع بسیاری از بیماریها جلوگیری می کند



شکل شماره ۸- شستشو و ضد عفونی مداوم  
وسایل مرغداری را هرگز فراموش نکنید

### بهداشت لانه

- ۱- هر هفت تا ده روز یک بار،  
فضولات درون لانه ها را جمع آوری  
کنید و کف لانه را تمیز کنید.
- ۲- هر ده روز یک بار آبخوری ها و  
دانخوری ها را خوب شسته و با  
مواد مناسب ضد عفونی کنید.



۳- در لانه‌هایی که به صورت دوره‌ای مرغ پرورش داده می‌شود، باید بعد از خالی شدن لانه از یک دوره پرورش، سقف، دیوارها و کف ضد عفونی شود. در لانه‌هایی که به طور دائمی مرغ نگهداری می‌شود، هر یک ماه تا چهل و پنج روز یک بار باید لانه را ضد عفونی کنید.

۴- برای ضد عفونی می‌توان از آب آهک پنج درصد و یا محلول‌های ضد عفونی کننده دیگر استفاده کرد. هنگام استفاده از این محلول‌ها به دستور تهیه و مصرف آنها توجه کنید.

۵- هرگز به طور مداوم از یک ماده ضد عفونی کننده استفاده نکنید.


۶- مواد ضد عفونی کننده را از دسترس کودکان، طیور و دام‌ها دور نگه دارید.

### غذای مرغ بومی

مرغ بومی می‌تواند از ته مانده سفره و باقی مانده محصولات کشاورزی استفاده کند. همچنین پس چرگیاهان زراعی نیز برای این مرغ قابل استفاده است. به دلیل حرکت زیادی که مرغ بومی دارد، می‌تواند حشره‌ها و کرم‌ها را نیز بخورد.

این مرغ‌ها نسبت به مرغ‌های ماشینی در برابر کمبودهای غذایی حساسیت کمتری دارند. مرغ‌های بومی از دانه‌های هضم نشده غلات در مدفوع دام‌هایی مانند گاو نیز استفاده می‌کنند.

در زمستان و هنگامی که تولید مرغ‌ها بالا است، مقداری غذای دستی نیز باید به مرغ‌ها داده شود. دانه‌های شکسته و نامرغوب که از بوخاری گندم و جو به دست می‌آیند، برای این کار مناسب هستند. همچنین دانه‌های ریز برنج که برای انسان قابل مصرف نیست، می‌تواند غذای مرغ‌ها باشد. زیره و سیوس گندم و برنج، تفاله‌های گیاهان زراعی، خرد سبزی‌ها و گیاهان علوفه‌ای نیز غذای خوبی برای مرغ‌ها هستند.



شکل شماره ۹ - تقدیم یکسان گله مورد توجه قرار گیرد


### رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری‌ها

همه ما می‌دانیم که پیشگیری از بیماری خیلی بهتر و به صرفه‌تر از درمان است.

پیشگیری به سه عامل بهداشت، مدیریت درست و مایه‌کوبی (واکسیناسیون) به موقع بستگی دارد.

در اینجا به چند نکته بهداشتی اشاره می‌کنیم:

- ۱- جوجه‌ها را نباید در لانه‌هایی که مرغ در آنجا بوده قرار داد. مگر این که لانه به طور کامل تمیز و ضد عفونی شود، سپس جوجه‌ها را وارد آنجا کنیم.
- ۲- ظرف‌های آبخوری مرغ‌ها و جوجه‌ها باید به طور مرتب تمیز شود.
- ۳- دانخوری را باید تمیز نگه داشت. همچنین دانه‌هایی که با فضولات مرغ‌ها و جوجه‌ها مخلوط شده‌اند و یا کپک زده‌اند را باید دور بریزید.
- ۴- اجازه ندهید مرغ‌های بیمار وارد جمع مرغ‌های شما شوند.
- ۵- لاشه مرغ‌ها و جوجه‌های مرده را فوری از لانه خارج کنید و به همراه آهک در خاک دفن کنید.



شکل شماره ۱۰ - لانه غیربدهاشتی و نامناسب موجب بیماری و شیوع آن می‌شود

### بیماری‌های طیور

بیماری‌ها بر اثر عامل‌های مختلف میکروبی، ویروسی، انگلی، قارچی، تغذیه‌ای و غیره به وجود می‌آیند. در این نشریه تنها به بیماری نیوکاسل که در بین مرغ‌ها خیلی شایع است، اشاره می‌کنیم. توجه داشته باشید که در پیشگیری از بیماری‌ها باید دستورهای دامپزشکی را اجرا کنید. همچنین هنگام بیماری طیور، فوری به دامپزشکی مراجعه کنید.

### بیماری نیوکاسل

این بیماری از یک نوع ویروس به وجود می‌آید و باعث عفونت دستگاه تنفسی مرغ می‌شود. بسیاری از بیماری‌های خطرناک و کشنده طیور مانند برونشیت عفونی هم از بیماری‌های ویروسی هستند. بیماری نیوکاسل واگیردار است و در بسیاری از پرندگان مانند مرغ‌ها و سوقلمونها دیده می‌شود. این بیماری در کشور ما از بیماری‌های خطرناک طیور به حساب می‌آید.

نشانه‌های بیماری آبریزش بینی، خرخزکردن، اشکال در تنفس و صدایی شبیه سوت کشیدن عطسه است. به علاوه مرغ بیمار، نفس نفس می‌زند، با دهان باز نفس می‌کشد، افسرده، گوش‌های گیر و بی‌اشتها می‌شود. کم‌کم، نشانه‌های عصبی مانند فلنج و لرزش عضله‌ها نیز در حیوان به وجود می‌آید. بیماری نیوکاسل به سرعت به تمام مرغ‌ها منتقل می‌شود. یعنی در مدت سه تا چهار روز تمام مرغ‌های یک گله آلوده می‌شوند. زیرا ویروس بیماری از راه هوا پخش می‌شود.

### پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل

مهم‌ترین راه پیشگیری و مبارزه با این بیماری خطرناک، دور نگه داشتن طیور از ویروس بیماری است. به علاوه تزریق واکسن در پیشگیری از این بیماری خطرناک اثر زیادی دارد. برنامه تزریق واکسن به جوجه‌ها باید با توجه به نوع آب و هوای منطقه، نوع واکسن و دستور دامپزشک باشد.



شکل شماره ۱۱ - واکسیناسیون قبل از ایجاد بیماری مفید خواهد بود

## درمان

هنوز برای این بیماری، راه درمان قطعی کشف نشده است. تنها با رعایت نکته‌های بهداشتی و تزريق واکسن می‌توان از آلوده شدن طیور جلوگیری کرد. در صورت دچار شدن طیور به این بیماری باید همه آنان را از بین ببریم.

## چند نکته مهم بهداشتی

- هنگام شیوع بیماری نیوکاسل با جداسازی طیور یا قرنطینه و مراجعته به دامپزشک بیماری را کنترل کنید.
- طیور را در برابر بیماری‌های مهم مثل نیوکاسل، آبله، مارک و غیره واکسن بزنید.
- طیور تلف شده را فوری از لانه خارج کنید و در محلی دور از لانه بین دولایه آهکی دفن کنید.
- مقدار داروها و زمان دقیق خوراندن آنها را به طور دقیق رعایت کنید.

## خلاصه مطالعه

- ۱- تزاد مرغ تخمگذار سبک وزن و کوچک اندام است. مرغهای این تزاد، بیشتر وقت‌ها در حرکت و در حال جستجوی غذا هستند.
- ۲- تخم مرغهای بدون نطفه و بدون کيسه هوایی برای جووجه کشی خوب نیستند.
- ۳- مرغهای کرج، شبها در لانهای که در آن تخم می‌گذارند، می‌خوابند. همچنین هنگام نزدیک شدن به آنان صدای جیغ مانندی از خود درمی‌آورند.
- ۴- در انتخاب محل خوابیدن مرغ کرج باید دقت کرد. به علاوه، تعداد تخم مرغها باید به اندازه کافی باشد تا همه تخم‌ها در زیر مرغ قرار بگیرند.
- ۵- ماه اول برای جووجه‌ها بسیار حساس است، زیرا به مراقبت زیادی نیاز دارند.
- ۶- مهم‌ترین مشکل مرغ بومی، تلفات جووجه‌ها است. برای جلوگیری از این تلفات، واکسن زدن به موقع و جلوگیری از آسیب‌های فیزیکی بهترین راه است.
- ۷- لانه مرغ‌ها، باید از زمین بلندتر باشد. به علاوه کف و دیواره آن سیمانی و شیبدار باشد.
- ۸- مرغ بومی می‌تواند از ته مانده غذایها و باقی‌مانده محصولات کشاورزی استفاده کند.
- ۹- برای پیشگیری از بیماری‌هایی مانند نیوکاسل، آبله، مارک و غیره به مرغ واکسن بزنید.
- ۱۰- هنگام شیوع بیماری، جداسازی مرغ‌ها یا قرنطینه را انجام دهید.



## پرسش و خودآزمایی

- ۱- نژادهای تخم‌گذار چگونه هستند؟
- ۲- تخم مرغ‌هایی که برای جووجه کشی انتخاب می‌شوند، باید چگونه باشند؟
- ۳- نشانه‌های مرغ کرج کدامند؟
- ۴- چه محلی برای خوابیدن مرغ کرج مناسب است؟
- ۵- اگر یکی از تخم‌ها از زیر مرغ کرج بیرون باشد، چه می‌شود؟
- ۶- جووجه‌ها در ماه اول به چه مراقبت‌هایی نیاز دارد؟
- ۷- لانه مرغ‌ها باید چگونه باشد؟
- ۸- مرغ‌های بومی از چه غذاهایی می‌توانند استفاده کنند؟
- ۹- برای جلوگیری از تلفات مرغ‌ها چه باید کرد؟
- ۱۰- بیماری نیوکاسل چگونه منتقل می‌شود؟
- ۱۱- پنج نکته بهداشتی برای پیشگیری از بیماری‌ها یتویسید.

## چند نکته:

- رعایت اصول بهداشتی در پرورش مرغ بومی باعث تولید خوب و افزایش درآمد شما می‌شود.
- از مهمترین اصول پرورش مرغ بومی انتخاب تزاد و تخم مرغ مناسب است.
- ماه اول زندگی جوجه‌ها بسیار مهم است. از آنها خوب مراقبت کنید.
- در موقع تخمگذاری، غذای تکمیلی به مرغ‌ها بدهید.
- در ساخت لانه از مصالح مرغوب و مناسب استفاده کنید.
- برای ضد عفونی لانه‌ها از آب آهک پسنج در صد یا محلول‌های ضد عفونی کننده دیگر استفاده کنید.
- هر ده روز یک بار دانخوری و آبخوری را شسته و ضد عفونی کنید.
- مرغ‌های بیمار را بلا فاصله از گله جدا کنید.
- مرغ‌ها و جوجه‌های هر ده را به همراه آهک در خاک دفن کنید.
- واکسیناسیون بر علیه بیماری نیوکاسل را هرگز فراموش نکنید.

